



Skydda dig själv



Skydda andra



Hindra smittspridningen

Pandemrix® pandemisk influensavaccin (H1N1)

Grundvaccination

Datum: _____

Påfyllnadsvaccination

Bör tas efter ett intervall om minst tre veckor

Datum för påfyllnadsvaccination
rekommenderat av vaccinatören: _____

Om biverkningar

Liksom alla läkemedel kan influensavaccin hos en del personer orsaka biverkningar.

Mycket vanliga biverkningar (kan inträffa vid fler än 1 av 10 vaccindoser):

- Lokala reaktioner vid instickstället som smärta, rodnad, svullnad eller förhårdnad.
- Influensaliknande symtom som huvudvärk, trötthet, feber, muskel- och ledvärk något dygn efter injektionen.

Vanliga (kan inträffa vid upp till 1 av 10 vaccindoser):

- Värmekänsla, klåda eller blåmärke vid injektionsstället.
- Svettning, frossa, svullna körtlar på halsen, i armhålan eller ljumsken.

Mindre vanliga (kan inträffa vid upp till 1 av 100 vaccindoser):

- Stickningar eller domningar i händer eller fötter; sömnhet, yrsel, diarré, kräkningar, magont, klåda, utslag, sömnlöshet.

Ovan nämnda reaktioner försvinner vanligen inom 1-2 dagar utan behandling.

Svåra biverkningar som till exempel allergiska reaktioner kan förekomma i anslutning till vaccination. I sällsynta fall kan dessa leda till chock. Vaccinatörerna är medvetna om denna risk och har akut behandling tillgänglig för sådana tillfällen.

Om du upplever biverkningar efter vaccinationen som förvärras över tid eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din vaccinator.