

Vaccination mot den nya influensan



En eller två sprutor?

En spruta

En spruta räcker för friska personer från 13 år och uppåt, friska gravida samt riskgrupper med fullgott immunförsvar för att ge skydd mot den nya influensan A(H1N1).

Två sprutor

Barn och riskgrupper med nedsatt immunförsvar behöver få två sprutor.

I Norrbotten gäller följande:

- Barn upp till 13 år erbjuds sin andra spruta efter att vaccinationen av hela befolkningen med en spruta har genomförts. Information om när det blir aktuellt kommer att förmedlas via www.nll.se/nyainfluensan och via media.
- Vissa individer har, på grund av sjukdom eller behandling, så kraftigt nedsatt immunförsvar att de bör erbjudas en andra spruta så snart som möjligt. Dock tidigast tre veckor efter den första sprutan.

Kontakta alltid behandlande läkare för att ta reda på om just du tillhör denna riskgrupp. Följande är en vägledning om vilka sjukdomar eller behandlingar som avses:

- Sjukdomar i immunsystemet, inklusive HIV
- Kronisk njursvikt som kräver dialys
- Kronisk leversvikt - individuell bedömning
- Transplanterad person
- Behandling med cytostatika, TNF alpha antagonister eller med Prednisolon 15 mg per dag i minst 1 månad.